

المرجح

6) إحدائيات المرجح:

ليكن G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ إحدائيات G هي

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{\alpha + \beta}(\alpha x_A + \beta x_B) \\ y_G = \frac{1}{\alpha + \beta}(\alpha y_A + \beta y_B) \end{cases}$$

II) مرجح ثلاث نقط.

1) تعريف: لتكن $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ ثلاث نقط متزنة.

إذا كان $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ فإنه توجد نقطة وحيدة G تحقق:

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

المرجح G تسمى النقطة G تسمى المرجح $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ أو مرجح النظم المتزنة

$$\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$$

2) خاصية مميزة:

تكون النقطة G مرجح النظم $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ إذا وفقط إذا

$$\text{كان: } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma}(\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}) \text{ لكل } O \text{ من المستوى } P$$

ملاحظة: نفس ملاحظة I).

3) المرجح لا يتغير إذا ضربنا أو قسمنا الأوزان على نفس عدد غير منعدم.

4) ليكن G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ مع $(\alpha \neq 0)$.

لدينا G مرجح $\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$. المرجح G يسمى في هذه

الحالة مركز ثقل النقط A, B, C أو مركز ثقل المثلث (ABC) .

خاصة: مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ هو

مرجح $\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$ وهو مركز ثقل (ABC) .

5) إحدائيات المرجح:

ليكن G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ إحدائيات G هي

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma}(\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C) \\ y_G = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma}(\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C) \end{cases}$$

6) التجميعية:

إذا كان G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ و G_1 مرجح

$\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ فإن G مرجح $\{(G_1, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$ وهذا يعني


أن مرجح ثلاث نقط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحهما متزن

بمجموع وزني تلك النقطتين.

7) ليكن (ABC) مثلثا مركز ثقله G

G هو مرجح $\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$

A', B', C' منتصفات



$[AB]$ و $[AC]$ و $[BC]$ على التوالي المتوسطات

(AA') و (BB') و (CC') تتلاقى في G .

$$\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{CC'} \quad \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BB'} \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AA'}$$

ولدينا $\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{CC'} \quad \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BB'} \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AA'}$

نسمى نقطة متزنة كل زوج (A, α) حيث A نقطة من المستوى و α عدد حقيقي.

I) مرجح نقطتين:

1) تعريف: لتكن (A, α) و (B, β) نقطتين متزنتين.

إذا كان $\alpha + \beta \neq 0$ فإنه توجد نقطة وحيدة G تحقق

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

النقطة G تسمى مرجح النقطتين المتزنتين (A, α) و (B, β) أو

مرجح النظم المتزنة $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

2) خاصية مميزة:

تكون النقطة G مرجح النظم $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ إذا وفقط إذا كان

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha + \beta}(\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}) \text{ لكل } \theta \text{ من المستوى } P.$$

ملاحظة:

a) إذا أردنا أن نبين أن G مرجح النظم $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

يستحسن استعمال التعريف ونبين أن $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. ولهذا نتبع

ما يلي:

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \alpha \overrightarrow{GA} + \beta (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = (\alpha + \beta) \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{AB}$$

ثم نحسب $\overrightarrow{GA}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ونعوض.

b) إذا كان G مرجح النظم $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ وأردنا حساب $\overrightarrow{AG}$

أو $\overrightarrow{BG}$ أو $\overrightarrow{CG}$ أو ... يستحسن استعمال الخاصية المميزة.

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha + \beta}(\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}) \text{ لكل } O \text{ من } P \text{ ثم نعوض } O \text{ بـ } A$$

أو B أو C ...

3) إذا كان G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ فإن G

مرجح $\{(A, k\alpha), (B, k\beta)\}$ لكل k من $\mathbb{R}^*$. وهذا يعني أن المرجح

لا يتغير إذا ضربنا الأوزان أو قسمناها على عدد غير منعدم.

4) ليكن G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ مع $(\alpha \neq 0)$ يسمى

مركز ثقل A و B .

لدينا من خلال ما سبق G مرجح $\{(A, 1), (B, 1)\}$ إذن

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \text{ لكل } \theta \text{ من } P \text{ ومن أجل } O = A$$

$$\text{نجد } \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \text{ إذن } G \text{ منتصف } [AB]$$

خاصية: مرجح النظم $\{(A, 1), (B, 1)\}$ هو مرجح $\{(A, 1), (B, 1)\}$

وهو منتصف $[AB]$.

ملاحظة: إذا أردنا أن نبين أن I منتصف $[AB]$ نبين أن I

$$\text{مرجح } \{(A, 1), (B, 1)\} \text{ يعني } \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$$

5) ليكن G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ لدينا

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha + \beta}(\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}) \text{ لكل } O \text{ من } P \text{ ومن أجل } O = A$$

$$\text{نجد } \overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB} \text{ إذن } G \in (AB)$$

ملاحظة: إذا أردنا إنشاء المرجح G نقوم بحساب $\overrightarrow{AG}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$

أو $\overrightarrow{BG}$ بدلالة $\overrightarrow{BA}$.


5) إحدائيات المرجح:

ليكن G مرجح $\{(A, \alpha)(B, \beta)(C, \gamma)\}$ إحدائيات G هي

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma}(\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C) \\ y_G = \frac{1}{\alpha + \beta + \gamma}(\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C) \end{cases}$$

6) التجميعية:

إذا كان G مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ و G_1 مرجح $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ فإن G مرجح $\{(G_1, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$ وهذا يعني أن مرجح ثلاث نقط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحهما متزن بمجموع وزني تلك النقطتين.



7) ليكن (ABC) مثلثاً مركز ثقله G

G هو مرجح $\{(A, 1)(B, 1)(C, 1)\}$

$A'B'$ و $B'C'$ و $C'A'$ منتصفات

$[AB]$ و $[AC]$ و $[BC]$ على التوالي المتوسطات

(AA') و (BB') و (CC') تتلاقى في G .

$$\overline{CG} = \frac{2}{3}\overline{CC'} \quad \overline{BG} = \frac{2}{3}\overline{BB'} \quad \overline{AG} = \frac{2}{3}\overline{AA'}$$

III) مرجح أربع نقط:

نعرف بنفس الطريقة مرجح أربع نقط وسيكون لدينا نفس الخصائص السابقة. هناك فرق فقط في التجميعية حيث تصبح:

7) مرجح أربع نقط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحهما متزن بمجموع الوزنين أو عوضنا كل نقطتين بمرجحهما متزن بمجموع الوزنين، أو عوضنا ثلاث نقط بمرجحها متزن بمجموع الأوزان.