

هندسة بعض الجزيئات

1) القاعدة الثمانية والثمانية

نص القاعدتين:

القاعدة الثمانية:

تسعى الذرة ذات العدد الذري $Z \leq 4$ خلال التحول الكيميائي إلى إشباع طبقتها الخارجية بزواج إلكترونات، وذلك باكتساب أو فقدان أو إشراك عدد من الإلكترونات لتكتسب البنية الإلكترونية المستقرة للهيليوم.

القاعدة الثمانية:

تسعى ذرات العناصر ذات العدد الذري $4 \leq Z \leq 18$ إلى إشباع طبقاتها الخارجية بثمانية إلكترونات، وذلك باكتساب أو فقدان أو إشراك عدد من الإلكترونات لتأخذ البنية الإلكترونية لأقرب غاز نادر منها (النيون أو الأرجون).

• تطبيقات على الأيونات الأحادية الذرة المستقرة

ينتج الأيون الأحادي الذرة عن ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون واحد أو أكثر، بحيث البنية الإلكترونية للأيون هي البنية الإلكترونية لأقرب غاز خامل منها.

أمثلة:




2) الرابطة التساهمية

تعريف: تنتج الرابطة التساهمية عن إشراك زوج من الإلكترونات بين ذرتين، حيث تساهم كل واحدة إلكترون واحد ويحقق الزوج الإلكتروني المشترك تماسك الذرتين وإستقرار الرابطة التساهمية.


تمثل الرابطة التساهمية بخط صغير (-) يفصل بين رمزي عنصري الذرتين المترابطتين.

ملحوظة: عدد الروابط التساهمية التي يمكن أن تكونها ذرة ما مساويا لعدد الإلكترونات الذي يشبع طبقتها الخارجية لتحقيق القاعدة الثمانية أو الثمانية.

أمثلة: $(K)^1 : Z(H) = 1$ وبالتالي عدد الروابط بالنسبة لـ H : رابطة تساهمية واحدة مع ذرات أخرى، نقول أن



$(K)^2 (L)^4 : Z(C) = 6$. الكربون C يمكن أن يكون فقط أربع روابط نقول أن ذرة الكربون رباعية التكافؤ:



الإحتمالات الممكنة:

$Z(N) = 7$ (K)² (L)⁵ ذرة الأزوت N يمكن أن تكون ثلاثة روابط تساهمية ونقول أن N ثلاثية التكافؤ ،
الاحتمالات الممكنة: $\bar{N}-$ $-\bar{N}=$

$Z(O) = 8$ (K)² (L)⁶ : ذرة الأوكسجين O يمكن أن تكون رابطتين تساهميتين ، نقول أن O ثنائية التكافؤ :
الاحتمالات الممكنة: $\bar{O}=$ $-\bar{O}-$

3- هندسة بعض الجزيئات

• تمثيل الجزيئة حسب نموذج لويس

نموذج لويس للجزيئة يبرز نوع الروابط التساهمية أي الأزواج الإلكترونية الرابطة كما يبرز الأزواج الغير الرابطة (الحرّة) وتحقق فيه كل من القاعدة الثنائية ، الثمانية .
ولتمثيل الجزيئة نتبع المراحل التالية

- كتابة البنية الإلكترونية لكل ذرة

- تحديد n_t : العدد الإجمالي للإلكترونات الطبقات الخارجية للذرات المكونة للجزيئة .

- تحديد $n_d = \frac{n_t}{2}$: العدد الإجمالي للأزواج الإلكترونية

- تحديد n_L : العدد الإجمالي للأزواج الإلكترونية الرابطة للذرة X : $\begin{cases} n_L(H) = 2 - 1 = 1 \\ n_L = 8 - p \end{cases}$ مع p عدد

إلكترونات الطبقة الخارجية للذرة

- تحديد n'_d عدد الأزواج غير الرابطة بالنسبة للذرة X : $\begin{cases} n'_d(H) = \frac{1-1}{2} = 0 \\ n'_d(X) = \frac{P-n_L}{2} \end{cases}$

• مفهوم التماكب : المتماكبات جزيئات لها نفس الصيغة الإجمالية وتختلف من حيث الصيغة المنشورة

- الصيغة الإجمالية تحدد الذرات بعددها وجنسها التي تدخل في تركيب الجزيئة .

- الصيغة المنشورة تبرز جميع الروابط التساهمية بين ذرات الجزيئة .

- الصيغة نصف المنشورة لا تبرز جميع الروابط التساهمية مثل الرابطة بين الكربون C والهيدروجين H

• هندسة بعض الجزيئات : تأخذ كل جزيئة شكلا هندسيا معينا ويرجع ذلك إلى تنافر الأزواج الرابطة وغير

الرابطة .

مثال:

• تمثيل كرام Cram

تمثيل الجزيئات بكيفية بسيطة

