

التوالد الجنسي عند كاسيات البذور

- تهدف وظيفة التوالد عند الكائنات الحية إلى الكاثر والاستمرارية والحفاظ على بقاء النوع.
- التوالد الجنسي يتم بتدخل جنسين ذكري وأنثوي من خلال ظاهرة الإخصاب.
- عند النباتات الزهرية يتم التوالد الجنسي على مستوى الزهرة.

أ- تعضي أجهزة التوالد :

1- الانقسام غير المباشر

- تتعرض خلايا البرعم الذهري لانقسامات متتالية تؤدي إلى تشكيل وتبرعم الزهرة. هذه الانقسامات تسمى انقسامات غير مباشرة.
- الانقسام غير المباشر ظاهرة مسترسلة تتعرض لها الخلايا ، يمكن تقسيم هذه الظاهرة إلى أربعة مراحل : التمهيدية الاستوائية، الانفصالية، النهائية.
- من خلال ملاحظة خلايا في طور الانقسام غير المباشر ، يتضح على أن شكل الخلية يتغير ويتجلّ ذلك في اختفاء النواة وظهور بناء على شكل عصيات نسميتها الصبغيات ، هذه الأخيرة يتغير شكلها وتوضعها ومصيرها من مرحلة إلى أخرى من مراحل الانقسام غير المباشر ، وبالتالي فكل مرحلة لمراحل الانقسام الغير المباشر مميزات خاصة بها.

2- مكونات الزهرة.

- تعتبر كاسيات البذور نباتات زهرية تتميز بكونها تنتج البذور داخل الثمرة التي تتكون داخل الزهرة .

1.2- ملاحظة وشرح زهرة.

- × تتكون الزهرة من أعضاء وقائية وأعضاء توادلية
- × الأعضاء الوقائية : تسمى أيضا غلاف الزهرة ، تتكون من كأس وهو مجموع الأوراق الكأسية ذات اللون الأخضر عند أغلب الأزهار
- توبع : هو مجموع الأوراق التوبيجية التي تعطي لون الزهرة.
- × الأعضاء التوادلية : هناك الجهاز الذكري الذي يسمى الكش ويتكون من مجموعة الأسدية . وهناك الجهاز الأنثوي الذي يسمى المدقة . تتكون كل مدققة من كربلة أو كربلات . تتكون الكربلة من بببستانين أو عدة ببستانات .

2- الجهاز الذكري

- السداة تمثل الجهاز الذكري للزهرة. تتكون السداة من مثير يحتوي على أكياس اللقاح مكان تشكل حبوب اللقاح .
- يتمد المثير بواسطة خيط يثبته على قرص الزهرة .
- تتكون حبة اللقاح داخل الكيس اللقاحي . تحتوي حبة اللقاح على خلقتين ، خلية إنباتية كبيرة تضم بداخلها خلية توادلية .

3- الجهاز الأنثوي : المدققة

- تتكون المدققة من ميسم في الطرف العلوي يرتبط بالببستان الموجود في الأسفل بواسطة القلم .
- الببستان يتكون من كربلة أو كربلات . بالكربلة ببستانات .
- ترتبط الببستانة بالمشيمة بواسطة الحبل السري . تتكون الببستانة من نسيج يسمى الجوزة .
- تحتوي الببستانة على كيس حنفي يحيط بالجوزة غشاءان يحدان فتحة صغيرة تسمى النفير .
- يحتوي الكيس الجنيني على سبعة خلايا : الببستانة غير الملقة ، ثلاثة خلايا معاكسة ، خلية مساعدتان ، والخلية المركزية التي تحتوي على نوتين .
- الخلية التوادلية لحبة اللقاح هي مصدر المشيق الذكري ، الببستانة غير الملقة للكيس الجنيني هي مصدر المشيق الأنثوي .

II- شكل الأمشاج :

1- الانقسام الاختزالي :

- الانقسام الاختزالي ظاهرة تتعرض لها الخلايا الأم للأمساج (أو للأبواغ) الثانية الصبغية الصبغية لتعطي بعد انقسامين متتاليين أربعة خلايا أحادية الصبغية الصبغية التي تتحول إلى أمشاج أو أبواغ هذين الانقسامين هما :

الانقسام الأول انقسام منصف. الانقسام الثاني انقسام تعادلي. كل انقسام يضم الأطوار الأربع للانقسام غير المباشر. هكذا نتكلم عن التمهيدية I، الاستوائية I، الانفصالية I والنهاية I، ثم التمهيدية II، والاستوائية II والانفصالية II والنهاية II.

I التمهيدية

- ظهور الصبغيات.

- اختفاء الغشاء النووي والتوية.

- اقتران الصبغيات الأزواج مشكلة رباعيات.

II الاستوائية

- تشكل المغزل اللالوني (ألياف صبغية + ألياف قطبية).

- تمووضع الصبغيات على مستوى خط استواء الخلية مشكلة صفيحة استوائية.

- الصبغيات المتماثلات متقابلات.

III الانفصالية

- افتراق الصبغيين المتماثلين لكل زوج صبغي دون انتشار الجزء المركزي

- هجرة كل صبغي متمايل نحو أحد قطبي الخلية.

IV النهاية II

- تشكل خلتيني بنتين كل واحدة ترث نصف عدد صبغيات الخلية الأم

- انقسام سينيوبلازم بالتساوي بين الخلتيني الابنتين من خلال تشكيل جدار فاصل.

V النهاية I

- تكون المغزل اللالوني ونمواً صبغيات على مستوى خط استواء الخلية.

VI الانصالية

- انتشار الجزء المركزي لكل صبغي فيفصل الصبغيان ويهاجر كل واحد إلى أحد قطبي الخلية.

VII النهاية I

- انقسام سينيوبلازم كل خلية لتشكل أربعة خلايا بذات أحادية الصبغية تحمل كل واحدة نصف عدد صبغيات الخلية الأم.

2. تشكيل حبوب اللقاح

- تخضع الخلية الأم (2n) لحبوب اللقاح داخل الكيس اللاقحي لانقسام اخترالي يؤدي إلى تشكيل أربعة خلايا أحادية الصبغية تسمى الأبواغ المجهرية. يخضع كل واحد من هذه الأبواغ لانقسام غير مباشر فتشكل حبة اللقاح التي تضم خلية إنباتية وخلية توادية، هذه الأخيرة هي مصدر المشيق الذكري.

3. تشكيل الكيس الجنيني

- تخضع الخلية الأم (2n) للكيس الجنيني لانقسام اخترالي لتعطي أربعة خلايا أحادية الصبغية، تتحل منها ثلاثة والرابعة التي تشكل بروغا كبيرة، تخضع بعد ذلك لثلاث انقسامات غير مباشرة متتالية، فتعطي 8 نوى موزعة على 7 خلايا، ثلاث خلايا معاكسة، خلستان مساعدتان، خلية مركبة بنواتين والببيضة غير الملقحة التي تمثل المشيق الأنثوي.

III. الإخصاب وتشكل البدور

1. الأبر

- حدوث الإخصاب يجب أن يتم نقل حبوب اللقاح من المثير إلى الميس، إنها ظاهرة الأبر.

- يتم الأبر بمساعدة عدة عوامل أهمها: الرياح، المياه، الحشرات، أو بتدخل حيوانات أخرى أو أحياناً بتدخل الإنسان.

- يبعث الأبر بال المباشر (ذاتي) عندما يتم بين حبوب لقاح وموسم ينتميان إلى نفس الزهرة. وينبعث الأبر بغير الذاتي أو المقاطع عندما يتم نقل حبوب لقاح من زهرة إلى زهرة أخرى.

2. إنبات حبوب اللقاح

تنبت حبوب اللقاح بعد سقوطها على الميس. بعد ذلك تستطيل حبة اللقاح مشكلة أنبوب اللقاح، هذا الأخير يدخل إلى قلم المدقّة ويمتد داخلها في اتجاه الببيضات.

تتعرض النواة التوادية داخل أنبوب اللقاح إلى انقسام غير مباشر ينتج عنه تشكيل حبيبين مثيرين (مشيجين ذكرين) أما النواة الإنباتية

فيصيبيها الانحلال عند وصول أنبوب اللاقاح إلى البيضة

3 . الإخصاب المضاعف

- يدخل الأنبوب اللقاحي البيضة غير النقي ليرغ الحبيبين المثيرين.
- حي مثيري أول يلتزم مع البيضة غير الملحة فينفتح عن ذلك بيضة رئيسة (2n). تتطور هذه الأخيرة لتعطي الجنين.
- حي مثيري ثانٍ : يلتزم مع نواتي الكيس الجنيني فت تكون بيضة ثانوية (3n). تتكاثر لتعطي نسيجاً يسمى السويداء هذا الأخير يوفر للجنين مدخلات غذائية.
- بعد الإخصاب المضاعف تتحل الخلايا المتبقية للكيس الجنيني ويختفي المبيض فتشكل الثمرة وتتم البيضة فتشكل البذرة.
- تراكم البذرة المدخلات وتتعرض للتجفف وتدخل حياة بطئه في انتظار الإنبات.
- في الإخصاب المضاعف تتشكل بذور تحتوي على سويداء (مدخلات)، أحياناً لا يحدث الإخصاب الثاني وبالتالي لا تتشكل السويداء فت تكون البذور بدون سويداء.

IV . إنبات البذور

1 . من البذرة إلى النبتة

- البذور عبارة عن أجنة تحتوي على بشار النبتة. كل جنين يكون محاطاً بمدخلات غذائية. تتميز البذرة بقدرتها على تحمل ظروف قاسية. عند توفر شروط الإنبات تعطي البذرة نبتة جديدة تنمو وتتطور حتى النضج.
- يتجلّى إنبات البذرة في مجموعة من المراحل يمكن تلخيصها على النحو التالي:
 - تمزق القشرة الخارجية التي تحمي البذرة بعد انفصال هذه الأخيرة.
 - خروج الجذر الأول بعد نمو الجذير.
 - نمو واستطاللة السويق.
 - ظهور وريقات أولية.
 - سقوط القشرة وذبول الفلقتين.

2 . شروط إنبات البذرة :

يتطلب إنبات البذور ظروف ملائمة محددة أهمها : وجود الماء، الرطوبة، درجة الحرارة، الهواء.

3 . انتشار البذور

- تنتشر البذور وتعمّر أوساطاً مختلفة لتوظيفها أساليب مختلفة حيث تأخذ أشكالاً متنوعة تمكنها من التوسيع واستيطان أوساط جديدة.
- تساهم في انتشار البذور عدة عوامل أهمها :
 - الرياح : إذا كانت البذور خفيفة وتحتوي على أجنة.
 - الماء : خصوصاً بالنسبة للنباتات المائية.
 - الحيوانات : خصوصاً بالنسبة للتي لها أشكال قابلة للالتصاق (الشائكة) أو بعض البذور التي تؤكل ثمارها وتطرح داخل فضلات الحيوانات.