







▲ حمأة تسييدا ملاحظة بواسطة المجهر الإلكتروني



▲ مراحل تحرير حمأة VIIH جديد من طرف لمفاوية T معفننة

■ انجز رسميا تخطيطيا لمراحل تحرير حمأة VIIH من طرف لمفاوية T معفننة داخلا الإطار أسفله.

--	--	--	--




١- وضح كيف يتطور تركيز T4 و VII بالجسم :

أ- خلال 9 أشهر الأولى :

بـ- من 9 أشهر إلى 10 سنوات :


ت- ما بعد 10 سنوات:

و.ث. 3. مراحل تطور داء فقدان المناعة المكتسبة



ينتقل داء السيدا

عبر الإتصال الجنسي مع شريك مصاب

بواسطة الأدوات الحادة والغير
المعقمة أو الملوثة بالدممن المرأة المصابة إلى جنينها خلال
الحمل أو إلى طفليها أثناء الرضاعة**تجنبوا**

تعدد الشركاء الجنسيين

الحمل في حالة الإصابة
بفيروس السيدا


تبادل الحقن

تبذّوا

الإخلال في العلاقات الزوجية



استعمال العازل الطبي

استعمال الأدوات الحادة المعقمة
أو ذات الاستعمال الوحيدالعلاج في حالة الإصابة
بمرض منقول جنسياً**وتحمّلوا 5. وقاية الجهاز التناسلي**

طرق الوقاية	الأخطار التي تهدّد	الجهاز
<ul style="list-style-type: none"> - تجنب الاتصالات الجنسية غير المشروعة - استعمال العازل الطبي - الخposure للمراقبة الطبية باستمرار - إخبار الشريك الجنسي في حالة الإصابة - في حالة الإصابة بالمرض يجب الخposure لفحوصات طبية دقيقة والعلاج بواسطة المضادات الحيوية وفقاً لوصفه الطبيب 	<ul style="list-style-type: none"> - السيدا - مرض السيلان - السيفيليس (الزهري) - الكباد 9 Hepatite (ويمكن لهذه الأمراض أن تنتقل عبر الاتصالات الجنسية) 	الجهاز التناسلي