

التمرين الأول : (2,0 ن)

1 ■

توزيع أربع كرات مرقمة على 6 أشخاص يمكن أن يتم بخمس طرق مختلفة :

الطريقة الأولى : إعطاء شخص واحد الكرات الأربع.

الطريقة الثانية : إعطاء شخص واحد الكرة الأولى ثم نعطي الشخص الثاني الكرات الثلاث المتبقية.

الطريقة الثالثة : إعطاء شخص واحد كرتين و شخص ثانٍ كرتين.

الطريقة الرابعة : إعطاء شخص واحد كرة واحدة و شخص ثانٍ كرة واحدة و شخص ثالث كرتين.

الطريقة الخامسة : نعطي كل شخص كرة واحدة .

في الطريقة الأولى لدينا :

• C_6^1 إمكانية لاختيار الشخص الذي سنعطيه الكرات الأربع .

في الطريقة الثانية لدينا :

• C_6^1 إمكانية لاختيار الشخص الذي سنعطيه كرة واحدة

• C_4^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيها إيه

• C_5^1 إمكانية لاختيار الشخص الذي سنعطيه الكرات الثلاث المتبقية.

في الطريقة الثالثة لدينا :

• C_6^1 إمكانية لاختيار الشخص الذي سنعطيه الكرتدين

• C_4^1 إمكانية لاختيار الكرتدين.

• C_5^1 إمكانية لاختيار الشخص الآخر صاحب الكرتين المتبقيتين.

في الطريقة الرابعة لدينا :

• C_6^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الأولى.

• C_4^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيه.

• C_5^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الثانية.

• C_3^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيه.

• C_4^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرتين المتبقيتين.

في الطريقة الرابعة لدينا :

• C_6^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الأولى.

• C_4^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيه.

• C_5^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الثانية.

• C_3^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الثالثة.

• C_2^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيه.

• C_3^1 إمكانية لاختيار الشخص صاحب الكرة الرابعة.

• C_1^1 إمكانية لاختيار الكرة التي سنعطيه.

التطبيق العددي :

5 ط	4 ط	3 ط	2 ط	1 ط	الطريقة :
8640	1440	180	120	6	عدد الإمكانيات

و بالتالي : عدد الإمكانيات لتوزيع الكرات الأربع على الأشخاص ستة هو :

$$6 + 120 + 180 + 1440 + 8640 = 10386$$

② ■

الشخص A يمكنه أن يحصل على :

- كرة واحدة بـ C_4^1 إمكانية.
- أو يحصل على كرتين بـ C_4^2 إمكانية.
- أو يحصل على ثلاثة كرات بـ C_4^3 إمكانية.
- أو يحصل على أربع كرات بإمكانية واحدة .

إذن عدد الإمكانيات التي يحصل فيها الشخص A على كرة واحدة على الأقل هو :

$$C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 15$$

و منه : احتمال أن يحصل الشخص A على كرة واحدة على الأقل يساوي :

$$\frac{15}{10386} \approx 0,0015 \equiv 0,15\%$$

③ ■

إذا حصل الشخص C على كرة واحدة رقمها m و حصل الشخص B على كرة واحدة رقمها n فإن الشخص A سيحصل على $(m+n)$ كرة ولدينا :

$$m + n + 2 = 4$$

$$\Leftrightarrow m + n = 2$$

نعلم أن $m \neq n$ إذن هذه المعادلة لا تقبل حلولا في المجموعة $\{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$

و بالتالي نحن بصدد حدث مستحيل و احتمال وقوعه 0

التمرين الثاني : (4,0)

(I) ■

نضع : $f(z) = 0$ ثم ننطلق من الكتابة : $z = x + iy$

$$\Leftrightarrow (1 + i\sqrt{3})z + 2\bar{z} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 + i\sqrt{3})(x + iy) + 2(x - iy) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x - \sqrt{3}y) + i(-y + \sqrt{3}x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x - \sqrt{3}y = 0 \\ -y + \sqrt{3}x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \sqrt{3}y \\ 3x = \sqrt{3}y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z = x + i\sqrt{3}x$$

$$\Leftrightarrow z = x(1 + i\sqrt{3})$$

و منه : مجموعة حلول المعادلة $f(z) = 0$ في \mathbb{C} تكتب على الشكل :

$$S = \{ x(1 + i\sqrt{3}) \mid x \in \mathbb{R} \}$$

(II) ■

$$f(z) = \frac{1}{6}((1 + i\sqrt{3})z + 2\bar{z}) \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow f(z_n) = \frac{1}{6}((1 + i\sqrt{3})z_n + 2\bar{z}_n)$$

$$\Rightarrow |f(z_n)| = \left| \frac{1}{6}((1 + i\sqrt{3})z_n + 2\bar{z}_n) \right|$$

نعلم أن : $|z| = |\bar{z}|$ و $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

$$\Rightarrow |f(z_n)| \leq \frac{1}{6}|(1 + i\sqrt{3})z_n| + \frac{1}{6}|2\bar{z}_n| \quad \text{إذن :}$$

$$\Rightarrow |f(z_n)| \leq \left(\frac{1}{6}\right)2|z_n| + \left(\frac{2}{6}\right)|z_n|$$

$$\Rightarrow |f(z_n)| \leq \frac{2}{3}|z_n|$$

$$\Rightarrow |z_{n+1}| \leq \frac{2}{3}|z_n|$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \leq \frac{2}{3}u_n$$

و نعلم أن معيار عدد عقدي يكون دائماً موجباً.

$$(\forall n \in \mathbb{R}) \quad 0 \leq u_{n+1} \leq \frac{2}{3}u_n \quad \text{إذن :}$$

(II) ■

$$(\forall n \in \mathbb{R}) \quad 0 \leq u_{n+1} \leq \frac{2}{3}u_n \quad \text{لدينا :}$$

$$0 \leq u_n \leq \frac{2}{3}u_{n-1} \quad \text{من أجل } (n-1) \text{ نحصل على :}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq u_n \leq \frac{2}{3}u_{n-1}$$

$$\leq \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)u_{n-2}$$

$$\leq \left(\frac{2}{3}\right)^3 u_{n-3}$$

⋮

⋮

$$\downarrow \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n u_{n-n}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n u_0 \quad \text{و وبالتالي :}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \quad \text{لدينا :}$$

لأن $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ متتالية هندسية أساسها موجب و أصغر من 1

و وبالتالي : $(u_n)_n$ متقاربة و تؤول إلى الصفر

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n) = 0} \quad \text{يعني :}$$

(II) ■

$$\mathcal{S}_n = OM_0 + OM_1 + \cdots + OM_n \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{S}_n = |z_0| + |z_1| + \cdots + |z_n|$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{S}_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

$$(\forall n \in \mathbb{R}) \quad 0 \leq u_n \leq \frac{2}{3}u_{n-1} \quad \text{و نعلم أن :}$$

$$\begin{cases} u_0 \leq 1 \\ u_1 \leq \left(\frac{2}{3}\right) \\ \vdots \\ u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \end{cases} \quad \text{إذن :}$$

$$= \frac{2r}{3} \left(\left(\frac{3\cos\theta}{4} - \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{4} \right) + \left(i \frac{\sqrt{3}\cos\theta}{4} - i \frac{\sin\theta}{4} \right) \right)$$

$$= \frac{2r}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta - \frac{1}{2} \sin\theta \right) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta - \frac{1}{2} \sin\theta \right) \right)$$

$$= \frac{2r}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + i \frac{1}{2} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \right)$$

$$= \frac{2r}{3} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$$

$$\Leftrightarrow f(z) = \frac{2r}{3} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

————— (2)(III) ■

$k \in \{1, \dots, n\}$ هو لحق النقطة M_k بحيث : $f(z_{k-1})$:


$$f(z) = \frac{2r}{3} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)} \quad \text{ولدينا :}$$

$$\Rightarrow f(z_{k-1}) = \frac{2r}{3} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$\Rightarrow \arg(f(z_{k-1})) \equiv \arg\left(e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}\right) [2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg(f(z_{k-1})) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$$

و بالتالي النقط M_1 و M_2 و ... و M_n تنتهي إلى نفس المستقيم (Δ) المبين في الشكل التالي :



$$u_0 + u_1 + \dots + u_n \leq \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k \quad \text{و منه :}$$

$$\Leftrightarrow S_n \leq \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)} \right)$$

$$\Leftrightarrow S_n \leq 3 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right)$$

$$- \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \leq 0 \quad \text{إذن :} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \geq 0 \quad \text{ولدينا :}$$

$$\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) \leq 1 \quad \text{و منه :}$$

$$3 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) \leq 3 \quad \text{يعني :}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) : S_n \leq 3 \quad \text{و وبالتالي :}$$

————— (2)(II) ■

$$S_n = OM_0 + OM_1 + \dots + OM_n \quad \text{لدينا :}$$

نلاحظ أن :

$$(OM_0 + \dots + OM_n) + OM_{n+1} > (OM_0 + \dots + OM_n)$$

$$\text{إذن : } S_{n+1} > S_n$$

إذن $(S_n)_n$ متتالية متزايدة

و بما أنها مكبورة بالعدد 3 (يعني : $S_n \leq 3$) فإنها متقاربة.

————— (1)(III) ■

$$f(z) = \frac{1}{6} \left((1 + i\sqrt{3})z + 2\bar{z} \right) \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow f(z) = \frac{1}{6} (r(1 + i\sqrt{3})e^{i\theta} + 2re^{-i\theta})$$

$$\Leftrightarrow f(z) = \frac{2r}{3} \left(\left(\frac{1}{4} + i \frac{\sqrt{3}}{4} \right) e^{i\theta} + \frac{e^{-i\theta}}{2} \right)$$

$$= \frac{2r}{3} \left(\left(\frac{1}{4} + i \frac{\sqrt{3}}{4} \right) (\cos\theta + i \sin\theta) + \frac{1}{2} (\cos\theta - i \sin\theta) \right)$$

$$= \frac{2r}{3} \left(\frac{\cos\theta}{4} + i \frac{\sin\theta}{4} + i \frac{\sqrt{3}\cos\theta}{4} - \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{4} + \frac{\cos\theta}{2} - i \frac{\sin\theta}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow f(z) = \frac{2r}{3} \left(\frac{3\cos\theta}{4} + i \frac{\sqrt{3}\cos\theta}{4} - \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{4} - i \frac{\sin\theta}{4} \right)$$

التمرين الثالث : (3,5)

①(I) ■

$$2y^2 - 4y - 7x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(y^2 - 2y) = 7x$$

$$\Leftrightarrow 2(y-1)^2 = 7x + 2$$

$$\Leftrightarrow (y-1)^2 = \frac{7}{2}x + 1$$


$$\Leftrightarrow (y-1)^2 = \frac{7}{2}\left(x + \frac{2}{7}\right)$$

$$\text{إذن } (\Gamma) \text{ شلجم رأسه : } \Omega\left(\frac{-2}{7}; 1\right)$$

$$\text{و بورته : } F\left(\frac{7}{8} - \frac{2}{7}; 0 + 1\right)$$

$$\text{يعني : } F\left(\frac{33}{56}; 1\right)$$

②(I) ■



①(II) ■

$$2(y-1)^2 = 7x + 2 \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow 2(y^2 - 2y + 1) = 7x + 2$$

$$\Leftrightarrow 2y(y-2) = 7x$$

$$\Leftrightarrow 7 / 2y(y-2)$$

و بما أن العدد 7 أولي فإن :

$$\Leftrightarrow 7/2 \quad \text{أو} \quad 7/y \quad \text{أو} \quad 7 / (y-2)$$

$$\Leftrightarrow y \equiv 0[7] \quad \text{أو} \quad y \equiv 2[7]$$

• $y \equiv 0[7]$ في حالة :

$(\exists k \in \mathbb{Z}) ; y = 7k$ لدينا :

$2y(y-2) = 7x$ ولدينا :

$2(7k)(7k-2) = 7x$ يعني :

$x = 14k^2 - 4k$ إذن :

• $y \equiv 2[7]$ في حالة :

$(\exists k \in \mathbb{Z}) ; y = 7k + 2$ لدينا :

$2y(y-2) = 7x$ ولدينا :

$2(7k+2)(7k) = 7x$ يعني :

$x = 14k^2 + 4k$ إذن :

و بالتالي : مجموعة حلول المعادلة (E) هي :


$$E = \{(14k^2 - 4k ; 7k), (14k^2 + 4k ; 7k+2) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

②(II) ■

$x \wedge y = 9$ لدينا :

$y = 7k$ و $x = 14k^2 - 4k$ في حالة :

لدينا حسب خوارزمية إقليدس :



إذن من هذه القسمة الأقلية نستنتج أن :

$$(14k^2 - 4k) \wedge (7k) = (7k) \wedge (-4k) = k$$

$7 \wedge (-4) = 1$ لأن :

$x \wedge y = k = 9$ ومنه :

• $M_1(1098; 63)$ و منه نحصل على النقطة :

(٣) ■

$$u \rightarrow \frac{1 + \sin u}{2 + \cos u} \quad \text{لدينا :}$$

دالة متصلة على المجال $[0, \pi]$ لأنها خارج معرف الدالتين متصلتين على $[0, \pi]$ بحيث $2 + \cos u \neq 0$

. إذن فهي تقبل دالة أصلية F على المجال $[0, \pi]$.

يعني : F قابلة للإشتقاق على المجال $[0, \pi]$.

$$F'(x) = \frac{1 + \sin x}{2 + \cos x} \quad \text{ولدينا :}$$

(٤) ■

ليكن x عنصرا من المجال $[0, \pi]$

$$F(x) = \int_0^x \left(\frac{1 + \sin u}{2 + \cos u} \right) du \quad \text{لدينا :}$$

$$\frac{dt}{du} = \frac{1 + t^2}{2} \quad \text{إذن} \quad t = \tan\left(\frac{u}{2}\right) \quad \text{نضع :}$$

$$F(x) = \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\frac{1 + \left(\frac{2t}{1+t^2}\right)}{2 + \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \right) \left(\frac{2}{1+t^2} \right) dt \quad \text{و منه :}$$

$$F(x) = 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \frac{(t+1)^2}{(1+t^2)(3+t^2)} dt$$

(٥) ■

$$F(x) = 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \frac{(t+1)^2}{(1+t^2)(3+t^2)} dt$$

$$= 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\frac{t}{1+t^2} - \frac{t}{3+t^2} + \frac{1}{3+t^2} \right) dt$$

$$= 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\frac{t}{1+t^2} \right) dt - 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\frac{t}{3+t^2} \right) dt \\ + 2 \int_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \left(\frac{1}{3+t^2} \right) dt$$

$$= [\ln(1+t^2)]_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} - [\ln(3+t^2)]_0^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \\ + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right)$$

في حالة : $y = 7k + 2$ و $x = 14k^2 + 4k$

لدينا : $14k^2 + 4k = 2k(7k + 2)$

إذن من هذه النتيجة نستنتج أن :

$$(14k^2 + 4k) \wedge (7k + 2) = (7k + 2)$$

و منه : $x \wedge y = 7k + 2 = 9$

$k = 1$ يعني :

. $M_2(18; 9)$ و منه نحصل على النقطة :

التمرين الرابع : (٣,٠ ن)

(١) ■

$$\begin{aligned} \frac{t}{1+t^2} - \frac{t}{3+t^2} + \frac{1}{3+t^2} &= \frac{t}{1+t^2} + \frac{1-t}{3+t^2} \quad \text{لدينا :} \\ &= \frac{t(3+t^2) + (1-t)(1+t^2)}{(1+t^2)(3+t^2)} \\ &= \frac{t^2 + 2t + 1}{(1+t^2)(3+t^2)} \\ &= \frac{(t+1)^2}{(1+t^2)(3+t^2)} \end{aligned}$$

ملاحظة : المسار العكسي لهذه المتسلسلة سنت دراسته بتفاصيله في السنة الأولى من الأقسام التحضيرية أو الأسدس الثاني من الجامعة أو السنة الأولى من (BTS) . وهذه العملية تسمى :

< la décomposition d'une fraction rationnel en éléments simples >

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{-1}{(x-2)} + \frac{1}{(x-3)} \quad \text{مثال :}$$

(٢) ■

$$\int_0^\alpha \left(\frac{1}{3+t^2} \right) dt = \frac{1}{3} \int_0^\alpha \left(\frac{1}{1+\frac{t^2}{3}} \right) dt \quad \text{لدينا :}$$

$$dt = \sqrt{3} du \quad \text{إذن} \quad u = \frac{t}{\sqrt{3}} \quad \text{نضع :}$$

$$\int_0^\alpha \left(\frac{1}{3+t^2} \right) dt = \frac{\sqrt{3}}{3} \int_0^{\frac{\alpha}{\sqrt{3}}} \left(\frac{1}{1+u^2} \right) dt \quad \text{و منه :}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^\alpha \left(\frac{1}{3+t^2} \right) dt = \frac{\sqrt{3}}{3} [\operatorname{Arctan} u]_0^{\frac{\alpha}{\sqrt{3}}}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^\alpha \left(\frac{1}{3+t^2} \right) dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{Arctan} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{xe^{nx}} \right) = \frac{1}{n} \quad \text{لدينا:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f_n(x) - \frac{1}{n}x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{-nx}) = 0 \quad \text{ولدينا:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty \quad \text{كما نعلم أن:}$$

إذن من هذه النتائج نستنتج أن المستقيم $y = \frac{1}{n}x$ مقارب مائل بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f_n(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{xe^{nx}} \right) = +\infty \quad \text{ولدينا كذلك:}$$

(*)

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \left(\ln 3 + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right) + \ln \left(\frac{1 + \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right)}{3 + \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right)} \right) \right) = \int_0^\pi \left(\frac{1 + \sin u}{2 + \cos u} \right) du$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = -\infty \quad \text{ونعلم أن:}$$

إذن (\mathcal{C}_n) يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب نحو الأسفل.

(2) ■

$$f'_n(x) = \left(\frac{x}{n} - e^{-nx} \right)' = \frac{1}{n} + ne^{-nx} > 0$$

إذن f_n دالة تزايدية قطعا على \mathbb{R} .

نستنتج جدول تغيرات الدالة f_n كما يلي:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{Arctan}(" + \infty ") = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'_n(x)$	+	
f_n	$-\infty$	$+\infty$

(1) (3) ■

لدينا حسب جدول تغيرات الدالة f_n .

دالة متصلة و تزايدية قطعا على \mathbb{R} .

إذن f_n تقابل من \mathbb{R} نحو \mathbb{R} .

بما أن: $0 \in \mathbb{R}$ فإنه يمتلك سابقا واحدا α_n من \mathbb{R} بالتقابل

و بالتالي: $f_n(\alpha_n) = 0$

نعرض هاتين النهايتين في المتساوية (*) نحصل على:

$$\ln 3 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \int_0^\pi \left(\frac{1 + \sin u}{2 + \cos u} \right) du$$

التمرين الخامس : (3.0 ن)

(1) (1) ■

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{n} - e^{-nx} \right) = (+\infty) - 0 = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\frac{1}{n} - \frac{e^{-nx}}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{xe^{nx}} \right) \\ &= (-\infty) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{0^-} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$


و بالتالي حسب مبرهنة القيم الوسيطية :

$$\exists c \in \left[\frac{1}{n}, 1 \right] ; f_n(c) = 0$$

و بما أن المعادلة $f_n(x) = 0$ تقبل حلًا واحدًا هو α_n .

$$\frac{1}{n} < \alpha_n < 1 \quad \text{و منه: } \alpha_n = c \quad \text{فإن}$$

(4) ■



(E2) ■

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{\alpha_n}{n+1} - e^{-(n+1)\alpha_n}$$

$$\Leftrightarrow f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{\alpha_n - ne^{-(n+1)\alpha_n} - e^{-(n+1)\alpha_n}}{(n+1)}$$

$$\Leftrightarrow f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{ne^{-(n+1)\alpha_n}}{(n+1)} \left(\frac{\alpha_n}{ne^{-(n+1)\alpha_n}} - 1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$e^{-n\alpha_n} = \frac{\alpha_n}{n} \quad \text{إذن: } f_n(\alpha_n) = 0 \quad \text{و نعلم أن:}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha_n}{ne^{-(n+1)\alpha_n}} = \frac{\alpha_n}{n(e^{-n\alpha_n}) \cdot e^{-\alpha_n}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha_n}{ne^{-(n+1)\alpha_n}} = \frac{\alpha_n}{n \cdot \left(\frac{\alpha_n}{n} \right) \cdot e^{-\alpha_n}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha_n}{ne^{-(n+1)\alpha_n}} = e^{\alpha_n}$$

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{ne^{-(n+1)\alpha_n}}{(n+1)} \left(e^{\alpha_n} - 1 - \frac{1}{n} \right) \quad \text{و بالتالي:}$$

(3) ■

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{e}\right)$$

بما أن: $n \geq 2$ فإن:

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{e} \quad \text{و منه: } n^2 \geq 4 > e \quad \text{أي:} \\ \frac{1}{n^2} - \frac{1}{e} < 0 \quad \text{يعني:}$$

$$(\forall n \geq 2) ; f_n\left(\frac{1}{n}\right) < 0 \quad \text{و بالتالي:}$$

(3) ■

$$\varphi'(x) = e^x - 1 \quad \text{إذن: } \varphi(x) = e^x - x - 1 \quad \text{نضع:}$$

و منه: نستنتج جدول تغيرات الدالة φ كما يلي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$	-	0	+
φ	$+\infty$	0	$+\infty$

بما أن φ دالة متصلة على \mathbb{R} و قيمتها الدنيا حسب الجدول هي 0

فإنه: $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \varphi(x) \geq 0$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) ; e^x \geq x + 1 \quad \text{يعني:}$$

و من هذه المقاوطة نستنتج: $(\forall n \in \mathbb{N}) ; e^n \geq n + 1$

و منه: $(\forall n \in \mathbb{N}) ; e^n \geq n$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{e^n} < \frac{1}{n}$$

$$\Leftrightarrow e^{-n} < \frac{1}{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} - e^{-n} > 0 \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow f_n(1) = \frac{1}{n} - e^{-n} > 0$$

(3) ■

لدينا f_n دالة متصلة على \mathbb{R} .

إذن فهي متصلة على $[1; \frac{1}{n}]$ بحيث: $n \geq 2$

و لدينا: $f_n(1) > 0$ و $f_n\left(\frac{1}{n}\right) < 0$

إذن: $f_n(1) \cdot f_n\left(\frac{1}{n}\right) < 0$

٦)

. $n \geq 2$

$$e^{-n\alpha_n} = \frac{\alpha_n}{n} \quad \text{لدينا:} \quad f_n(\alpha_n) = 0$$

$$\frac{1}{n^2} < \frac{\alpha_n}{n} < \frac{1}{n} \quad \text{إذن:} \quad \frac{1}{n} < \alpha_n < 1$$

ونعلم أن:

$$\frac{1}{n^2} < e^{-n\alpha_n} < \frac{1}{n} \quad \text{وبالتالي:}$$

٦)

$$\frac{1}{n^2} < e^{-n\alpha_n} < \frac{1}{n} \quad \text{لدينا:}$$

$$\ln\left(\frac{1}{n^2}\right) < \ln(e^{-n\alpha_n}) < \ln\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{إذن:}$$

. لأن الدالة \ln تزايدية قطعا على \mathbb{R}_*^+

$$-2\ln(n) < -n\alpha_n < -\ln(n) \quad \text{و منه:}$$

$$\ln(n) < n\alpha_n < 2\ln(n) \quad \text{إذن:}$$

$$\frac{\ln(n)}{n} < \alpha_n < \frac{2\ln(n)}{n} \quad \text{وبالتالي:}$$

٦)

من التأطير الثمين الأخير الذي حصلنا عليه نستنتج أن:

$$\lim_{n \infty} (\alpha_n) = 0$$

$$\lim_{n \infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right) = \lim_{n \infty} \left(\frac{2\ln n}{n} \right) = 0 \quad \text{لأن:}$$

و الحمد لله رب العالمين ■

www.students.ma

٥)

$$(\#) \quad e^{\alpha_n} \geq \alpha_n + 1 \quad \text{لدينا حسب السؤال:}$$

$$\alpha_n > \frac{1}{n} \quad \text{لدينا حسب السؤال:}$$

$$(\#\#) \quad \alpha_n + 1 > \frac{1}{n} + 1 \quad \text{إذن:}$$

$$e^{\alpha_n} \geq \frac{1}{n} + 1 \quad \text{من (\#) و (\#\#) نستنتج أن:}$$

$$e^{\alpha_n} - \frac{1}{n} - 1 \geq 0 \quad \text{يعني:}$$

$$f_{n+1}(\alpha_n) \geq 0 \quad \text{وبالتالي:}$$

$$\frac{ne^{-(n+1)\alpha_n}}{(n+1)} \quad \text{لأن الكمية موجبة دائمًا.}$$

٥)

$$(*) \quad f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0 \quad \text{لدينا:}$$

. لأن $f_{n+1}(x) = 0$ حل للمعادلة:

$$(\star\star) \quad f_{n+1}(\alpha_n) \geq 0 \quad \text{ولدينا:}$$

من (*) و (**) نستنتج أن:

و بما أن f_{n+1} دالة تزايدية قطعا على \mathbb{R} .

$$\alpha_n \geq \alpha_{n+1} \quad \text{فإن:}$$

و بالتالي: $(\alpha_n)_n$ تناقصية.

$$\frac{1}{n} < \alpha_n \quad \text{و} \quad \frac{1}{n} > 0 \quad \text{ولدينا:}$$

$$\alpha_n > 0 \quad \text{إذن:}$$

(2) $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ مصغورة بالعدد 0 يعني:

من (1) و (2) نستنتج أن المتتالية $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة. و سوف نحدد نهايتها فيما بعد.