

عناصر الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

التمرين الأول: (4ن)

مقدمة: التذكير بالآليات المنتجة للطاقة وطبيعة هذه الطاقة.
عرض : تحديد مراحل إنتاج وإفراز البروتينات و دور الطاقة في كل مرحلة (دخول الأحماض الأمينية، تجميعها، نقل الحويصلات داخل السيتوبلاسم، ظاهرة الإخراج) مع الإشارة إلى العضيات المتدخلة.
خلاصة: تلخص أهمية الطاقة في النشاط الخلوي الإفرازي.


التمرين الثاني: (12ن)

- 1 - لا يحدث أي تغير في تركيز ATP في الوسط، بعد إضافة السكر في الزمن t0 و الكليكو في الزمن t1 و لكن يزداد هذا التركيز بشكل نسبي بعد إضافة حمض بيروفيك في الزمن t2 و يرتفع أكثر بإضافة حمض بيروفيك + ADP + Pi في الزمن t3 و يتوقف بعد إضافة مادة كابحة للنشاط الأنزيمي في الزمن t4.
- 2 - يمكن تفسير هذه النتائج بكون الميتوكوندري لا يستعمل السكر و الكليكو كمستقلبات لإنتاج ATP بينما يستعمل حمض البيروفيك لتفكيكه وإنتاج ATP عن طريق تفسفر ADP بوجود Pi و تتطلب هذه التفاعلات وجود أنزيمات ميتوكوندرية تتدخل في مراحل دورة كريبس و التفسفر المؤكسد.
- 3 - قبل إضافة الأوكسجين كانت نسبة ATP منعدمة و بعد إضافة الأوكسجين ارتفع تركيز ATP بشكل كبير .
- 4 - نستنتج أن الميتوكوندريات لا يمكنها إنتاج ATP إلا في وجود الأوكسجين.
- 5 - لا يحدث أي تغير في تركيز O2 في الوسط، بعد إضافة السكر و الكليكو و لكن يتناقص هذا التركيز بشكل نسبي بعد إضافة حمض بيروفيك و ينخفض أكثر بإضافة حمض بيروفيك + ADP + Pi و يتوقف بعد إضافة مادة كابحة للنشاط الأنزيمي.
- 6 - يمكن تفسير هذه النتائج بكون الميتوكوندريات لا تستعمل الأوكسجين بوجود السكر و الكليكو بينما تستهلكه في وجود مستقلب قابل للتفكيك كحمض البيروفيك و أن هذا الاستهلاك مرتبط بتفسفر ADP مما يفسر ارتفاع الاستهلاك بوجود ADP + Pi. كل هذه التفاعلات تتطلب وجود أنزيمات نشيطة .
- 7 - يعتبر الأوكسجين المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية و بالتالي المساعدة على أكسدة النواقل الحرة NADH و FADH2 المنتجة خلال تفكك المادة العضوية ،فانتقال الإلكترونات على مستوى السلسلة التنفسية يعمل على إخراج البروتونات من الماتريس إلى الحيز البيغشائي مما ينشأ عنه مجال للبروتونات يعتبر خزاناً للطاقة ، فتندفق هذه البروتونات عبر الكرات ذات شمراخ يساعد على تنشيط تفسفر ADP وإنتاج ATP و هذا ما يسمى التفسفر المؤكسد.
- 8 - على عكس الغشاء الخارجي، يحتوي الغشاء الداخلي على نسبة كبيرة من البروتينات الغشائية و أنزيمات منتجة لـ ATP و هذا راجع لكونه يعتبر مقراً للسلسلة التنفسية و التفسفر المؤكسد. بينما الغشاء الخارجي يشبه الغشاء الستوبلاسمي في بنيته فهو يسمح بالتبادلات بين الجبلة الشفافة و الميتوكوندري.
- 9 -



10- العينة 1: التخمر و العينة 2: التنفس

11 - التخمر الكحولي



التنفس

- 12 - العينة 1: التخمر ينتج طاقة ضعيفة تؤدي إلى تكاثر ضعيف.
- العينة 2: التنفس ينتج طاقة مهمة تؤدي إلى تكاثر مهم..

التمرين الثالث: (4ن)

- 1

اللييف b	اللييف a
شريط فاتح صغير + المنطقة H ضيقة + حزي Z متقاربين + طول الساركومير أصغر	شريط فاتح كبير + المنطقة H متسعة + حزي Z متباعدين + طول الساركومير أكبر
طول الشريط الداكن متساوي بين اللييفين	

- 2 - اللييف a في حالة ارتخاء بينما اللييف b في حالة تقلص.
- 3 - يجب إنجاز رسم تخطيطي لبنية الساركومير مع تحديد مختلف مكوناته.
- 4 - انخفاض في تركيز الكرياتين فوسفات و ارتفاع في تركيز Pi مع ثبات في تركيز ATP .
- 5 - يفسر ثبات تركيز ATP بتجديده.