

عناصر الإجابة

التمرين الأول: (16ان)

السؤال	عناصر الإجابة	التنقيط
1	يفسر انخفاض نسبة الكليكوز في الوسطين باستهلاكه من طرف الخمائر كمستقلب طافي .	1
1x2=2	- في الوسط A : نلاحظ استقرار في نسبة الأكسجين في قيمة $\mu\text{mol/l}$ 100 بينما ارتفعت نسبة CO_2 إلى حدود $200 \mu\text{mol/l}$. - في الوسط B : نلاحظ انخفاض في نسبة الأكسجين من $\mu\text{mol/l}$ 100 إلى أقل من $10 \mu\text{mol/l}$ بينما ارتفعت نسبة CO_2 بشكل كبير إلى حدود $325 \mu\text{mol/l}$.	2
1x2=2	- في الوسط A : عدم استهلاك الأكسجين من طرف الخمائر أثناء تفكيك الكليكوز مع إنتاج كمية من CO_2 أي تقوم باستقلاب طافي لاهواني رغم وجود الأكسجين . - في الوسط B : استهلاك الأكسجين من طرف الخمائر أثناء تفكيك الكليكوز مع إنتاج كمية كبيرة من CO_2 أي تقوم باستقلاب طافي هوائي .	3
2 x 0,5=1	- في الوسط A : تخمر كحولي . - في الوسط B : تنفس .	4
2	- التفاعل الاجمالي للتخمر الكحولي : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 2\text{ADP} + 2\text{Pi} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ATP}$	5
2 x 0,5=1	- في الوسط A : نلاحظ استقرار في نسبة الأكسجين بعد اضافة الايثanol. - في الوسط B : نلاحظ انخفاض في نسبة الأكسجين بعد اضافة الايثanol.	6
1 x 2=2	- في الوسط A : لم يتم استهلاك الأكسجين رغم وجود الايثanol و من تم لم يعتبر كمستقلب طافي و لم يدخل في أي تفاعل مستهلك للأكسجين قصد التفكيك. - في الوسط B : يتم استهلاك الايثanol كمستقلب طافي و من تم استهلاك الأكسجين لتفكيكه لانتزاع الطاقة المخزنة فيه .	7
4 x 0,25=1	1 - غشاء سيتوبلاسمى 2 - نواة 3 - ميتوكوندري 4 - جبلة شفافة	8
1 x 2=2	- السلالة A : غياب الميتوكوندريات و بالتالي عدم قدرتها على استعمال الأكسجين و من تم لجوئها إلى استقلاب طافي لاهواني يتجلّى في التخمر الكحولي . - السلالة B : وجود الميتوكوندريات و بالتالي قدرتها على استعمال الأكسجين و من تم لجوئها إلى استقلاب طافي هوائي يتجلّى في التنفس .	9
1 x 2=2	- السلالة A : استقلاب لاهواني عبارة عن تخمر كحولي يعطي طاقة ضعيفة 2ATP تؤدي إلى نمو ضعيف لخمائر A . - السلالة B : استقلاب هوائي عبارة عن تنفس يعطي طاقة مهمة 36ATP تؤدي إلى نمو كبير لخمائر السلالة B	10

التمرين الثاني: (4ان)

التنقيط	عناصر الإجابة	المقدمة
0,25	يتم إنتاج الطاقة داخل الخلية على عدة مستويات ، و تمثل الميتوكوندريات احدى اهم العضيات الخلوية التي يتم على مستواها إنتاج كمية مهمة من الطاقة على شكل ATP . فما هي مراحل هذا الإنتاج ؟	
	يعتبر حمض البيروفيك الناتج عن انحلال الكليكوز هو المستقلب الذي يتعرض لتفكيك على مستوى الميتوكوندري، و بالضبط على مستوى الماتريس خلال مرحلتين: 1 - تكوين أستيل كوانزيم A :	العرض
	$2\text{Ac.pyruvique} + 2\text{CoA} + 2\text{NAD} \rightarrow 2\text{Acetyl-CoA} + 2\text{CO}_2 + 2\text{NADH}$ يتعرض أستيل كوانزيم A إلى مجموعة تفاعلات انتزاع الكربون والهيدروجين تدعى دورة KREBS :	
3x0,2=0,6 12x0,2=2,4	$2\text{Acetyl-CoA} + 2\text{ADP} + 2\text{Pi} + 6\text{NAD} \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{ATP} + 6\text{NADH} + 2\text{FADH}_2 + 2\text{CoA}$ تنتج خلال هذه التفاعلات طاقة مباشرة على شكل ATP لكن تبقى أهم طاقة مخزنة في النواقل المختزلة NADH و FADH2 تتم اعادة اكسدة النواقل المختزلة على مستوى السلسلة التنفسية للغشاء الداخلي للميتوكوندريات لتنقل الاكترونات إلى المستقبل النهائي O_2 ، تعمل الطاقة المحررة أثناء انتقال الاكترونات على ادخال ايونات H^+ من الماتريس إلى الحيز بيقشاني مما يشكل مثالاً للبروتونات ضروري لتدفقها عبر الكرات ذات شمراخ ، هذه الاخيره تعتبر بمثابة أنزيم ATP سنتاز تساهم في التفسير المؤكسد حسب التفاعل:	
	$\text{ADP} + \text{Pi} \rightarrow \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$	
0,25	تستهلك الميتوكوندريات O_2 لتفكيك حمض البيروفيك - الناتجين عن انحلال الكليكوز - لانتاج طاقة مهمة تقدر بـ 30ATP بالإضافة إلى اعادة اكسدة النواقل المنتجة في الجبلة الشفافة وبذلك تساهم بالفقط الأوفر من الطاقة خلال ظاهرة التنفس..	الخلاصة